


Коксартроза

Коксартрозата представлява възрастово обусловен процес на дегенерация, засягащ основно хрущялното покритие на компонентите, изграждащи тазобедрената става (бедрена глава и ацетабулум). Най-често започва с промени в свойствата и структурата на колагена и полизахаридите, както и със загуба на водно съдържимо. Това рефлектира в дебелината на ставния хрущял и неговата възможност да понася въздействие на режещи сили и сили на натоварване. Тези процеси се развиват индивидуално, така че клиничната и рентгенологична изява могат да останат дълго време неразпознати или пък да прогресират за кратко време и да доведат до инвалидност хора в началото или в средата на трудовата си кариера. И ако идиопатичната коксартроза при не малко хора е трудно обяснима като генеза, то има състояния, които неминуемо водят до преждевременно износване на тазобедрената става, налагащо ендопротезиране на по-късен етап в името на доброто качество на живот:

- 1) Липса на конгруентност между компонентите изграждащи тазобедрената става. Среща се след заболяване на Legg-Calve-Perthes (асептична некроза на бедрената глава в детска възраст) или фрактури засягащи артикуларните повърхности
- 2) Нестабилност на тазобедрената става в случаите на сублуксация или дисплазия
- 3) След аваскуларна некроза на бедрената глава известна като Morbus Chandler.
- 4) При наличие на концентрация на силите на натоварване в сравнително малък участък от ставата. Такъв пример се явява заболяването „Coxa vara“
- 5) Директна травма на вътреставния хрущял
- 6) Редица заболявания като хипотиреоидизъм, хипофизарна дисфункция, диабет и др.
- 7) Общи и локални конституционални промени като затлъстяване или притискане в ставата (impingement syndrome)



здрава тазобедрена става

коксартроза

Екипът ортопеди на Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ винаги подхожда индивидуално към проблемите на пациентите с коксартроза. След изчерпване на възможностите за медикаментозно лечение разглеждаме възможностите и препоръчваме органосъхраняващо оперативно лечение. В крайните стадии на заболяването, когато възможностите на другите методи за лечение са изчерпани, съвременното лечение на коксартрозата е ендопротезирането на тазобедрената става.



ендопротезиране на тазобедрена става